INSECTICIDAS

- CEBOS
- SUSPENSIONES CONCENTRADAS
- FIJADOR EN GEL
- MICROENCAPSULADOS
- EMULSIONES CONCENTRADAS
- MICROEMULSIONES LISTO USO
- AEROSOLES
- TERMONEBULIZABLE LISTO USO
- VISUALIZADORES
- TRAMPAS DE MONITORIZACIÓN
- TRAMPAS MONITORIZACIÓN PRODUCTOS ALMACENADOS
- TRAMPAS DE CAPTURA

PRODUCTO	MATERIA ACTIVA	MODO DE EMPLEO	REGISTRO MSC	PLAZO SEGURIDAD	PRESENTACIÓN	PLAGA
DISTRIBUCIONES BASF. CEBO EN GEL						
MYTHIC GEL	Clorfenapir 0,4%	DOSIFICADOR DE GOTAS	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 14-30-06936 y 14-30-06936-HA	-	30 g. x 4	CUCARACHAS
GOLIATH GEL	Fipronil 0,05%	DOSIFICADOR DE GOTAS	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 09-30-01343 y 09-30-01343 HA	-	35 g. x 4	CUCARACHAS
FOURMIDOR	Fipronil 0,05%	DOSIFICADOR DE GOTAS	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 12-30-06299 y 12-30-06299 HA	-	25 g. x 10	HORMIGAS
DISTRIBUCIONES BASF. SUSPENSIONES CONCENTRADAS						
MYTHIC SC	Clorfenapir 10%	PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 11-30-06183 y 11-30-06183 HA	12 horas	500 ml. x 4	CUCARACHAS HORMIGAS CHINCHES
FENDONA	Alfacipermetrina 6%	PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 13-30-00006 y 13-30-00006 HA	12 horas	500 ml. x 4	CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS ARAÑAS CHINCHES
CEBO GRANULADO (INSECTOS RASTREROS)						
SWIRR 2 MG HORMIGAS	Acetamiprid 0,2%	ESPOLVOREO / PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 12-30-06291 y 12-30-006291-HA	0/12 horas	500 g. x 6	HORMIGAS
HORMIFIN SUPER ALFA	Alfacipermetrina 0,25%	ESPOLVOREO	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 11-30-01652 y 11-30-01652HA	-	500 g. x 10	HORMIGAS
CEBO GRANULADO (INSECTOS VOLADORES)						
SOFAST	Imidaclopird 0,5% Cis-tricos-9-eno 0,01%	ESPOLVOREO / PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 13-30/50-06724 y 13-30/50-06724-HA	0/12 horas	350 g. x 6	MOSCAS
AMP 5 GB	Acetamiprid 0,5% Z-9-TRICOSSENO 0,06%	MANUAL	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 09-30-/50-05361 y 09-30-/50-05361-HA (En renovación)	-	300 g. x 12	MOSCAS
CEBO EN BLOQUE						
MKI BLOCK	Acetamiprid 1,5%	MANUAL	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 10-30-05764 y 10-30-05764HA (En renovación)	-	5 Kg.	CUCARACHAS
POLVO						
SOMI	Deltametrina 0,05%	ESPOLVOREO	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 13-30-06775 y 13-30-06775-HA	-	500 g. x 6	CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS CHINCHES
SUSPENSIONES CONCENTRADAS						
DEFLOW	Deltametrina 2,25%	PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 09-30-03694 y 09-30-03694-HA	12 horas	1 L. x 4	CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS ARAÑAS MOSCAS AVISPAS
EMULSIONES CONCENTRADAS						
DOBOL 30/120	Acetamiprid 3% + Permetrina 12%	PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 14-30-07234 y 14-30-07234-HA	12 horas	1 L. x 12	CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS
PERMAPIN	Permetrina 12,5%	PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 15-30-00810 y 15-30-00810-HA	12 horas	1 L. x 12	CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS
CYPER-CIS	Cypermetrina 12,5%	PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 11-30-00806 y 11-30-00806-HA	12 horas	1 L. x 12	CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS
FIJADOR EN GEL						
MKI FIJADOR CIMEX	Acetamiprid 0,25%	MANUAL CON ESPÁTULA O BROCHA	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 12-30-06236 y 12-30-06236-HA	-	5 Kg. x 4	CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS CHINCHES
MKI FIJADOR PLUS	Acetamiprid 1%	MANUAL CON ESPÁTULA DOSIFICADOR	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 10-30-05747 y 10-30-05747-HA	-	5 Kg. x 4 300 g. x 12	CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS
LACAS						
MKI AQUALAK	Acetamiprid 0,25%	PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental e Ind. Alimentaria: 13-30-06639 y 13-30-06639-HA	12 horas	5 Kg. x 4	CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS CHINCHES
ADYLAC AEROSOL	Tetrametrina 0,25%, Alfacipermetrina 3,51% Cifenotrin 0,3% Deltametrina 1% Piriproxifen 0,011%	PULVERIZACIÓN	Uso Ambiental: 14-30-02450	24 horas	500 ml. x 6	CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS CHINCHES
AEROSOLES USO INDUSTRIA ALIMENTARIA						
PIRE FOG PLUS FD	Tetrametrina 0,65%, d-Fenotrin 0,16%, Cifenotrin 0,51%, Piriproxifen 0,01%	AEROSOL	Uso Ambiental: 15-30-05222 HA	12 horas	250 ml. x 8.	CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS ARAÑAS ÁCAROS
PIRE FOG FD	Tetrametrina 0,65%, d-Fenotrin 0,16%, Cifenotrin 0,51%	AEROSOL	Uso Ambiental: 09-30-05273 HA (En renovación)	12 horas	250 ml. x 8.	CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS ARAÑAS ÁCAROS
AEROSOLES USO AMBIENTAL						
PIRE FOG	Tetrametrina 0,65%, d-Fenotrin 0,16%, Cifenotrin 0,51%	AEROSOL	Uso Ambiental: 15-30-02875	12 horas	250 ml. x 8.	CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS ÁCAROS
PIRE FOG PLUS DT	Tetrametrina 0,65%, d-Fenotrin 0,16%, Cifenotrin 0,51%, Piriproxifen 0,01%	AEROSOL	Uso Ambiental: 15-30-05203	12 horas	250 ml. x 8.	CUCARACHAS HORMIGAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS ÁCAROS
TERMONEBULIZABLE LISTO USO						
PERME FOG	Permetrina 1,25%	TERMONEBULIZACIÓN	Uso Ambiental: 14-30-05038	12 horas	5 L. x 4	CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS
VISUALIZADORES						
VISUATER	Glicol/es.	TERMONEBULIZACIÓN	No procede	No precisa	5 L. x 4	

PLAGA	CUCARACHAS	HORMIGAS	PULGAS	CHINCHES	GARRAPATA	ARAÑAS	ÁCAROS	ESCARABAJO	POLILLAS	AVISPAS	MOSCAS
	Cucarachas: Blatella germánica, Blatta orientalis, Periplaneta americana	**Hormigas:** Lasius niger, Lasius neglectus, Formica sp.	**Pulgas:** Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Pulx irritans…	**Chinches:** Cimex lectolarius…	**Garrapatas:** Ixodes ricinus	**Arañas**	**Ácaros**	**Escarabajos/ Gorgojo Coleóptera:** Tribolium spp., Trogoderma, Sitophilus us	**Lepidópteros (polillas):** Plodia spp., Ephestia kuehniella	**Avispas:** Vespula vulgaris	**Moscas:** Musca domestica, Drosophilla spp.
MYTHIC GEL	●										
GOLIATH GEL	●										
FOURMIDOR		●									
MYTHIC SC	●	●		●							
FENDONA	●	●	●	●	●	●		●			
SWARR 2 MG HORMIGAS	●	●									
HORMIFIN SUPER ALFA	●	●									
SOFAST											●
AMP 5 GB											●
MKI BLOCK	●										
SOMI	●	●		●		●		●			
DEFLOW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DOBOL 30/20	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
PERMAPIN	●	●				●	●	●	●	●	●
CYPER-CIS	●	●				●	●	●	●	●	●
MKI FIJADOR CIMEX	●	●	●	●		●					
MKI FIJADOR PLUS	●	●				●					
MKI AQUALAK	●	●				●					
ADYLAC AEROSOL	●	●		●		●					
PIRE FOG PLUS FD	●	●	●		●		●				
PIRE FOG FD	●	●	●		●		●				
PIRE FOG	●						●	●	●		●
PIRE FOG PLUS DT	●						●	●	●		●
PERME FOG	●			●					●		●
VISUATER											

● ESPECIALMENTE RECOMENDADO ● EFICAZ

Mythic Gel

BASF
The Chemical Company

NOVEDAD

- **Características**
  Contiene Clorfenapir. Nueva clase de insecticida, con nuevo mecanismo de acción.
  Trabaja por contacto e ingestión y actúa sobre la síntesis de energía.
  Insecticida no piretroide, no repelente, indetectable para los insectos, particularmente eficaz en situaciones de resistencias a otros insecticidas.
  Las cucarachas aparecen muertas de 24 a 48 horas después del tratamiento de las áreas tratadas.
  La reducción o impacto significativo de la plaga se produce en unos pocos días.
  Es eficaz frente a cucarachas alemanas (Blattella germanica), cucaracha oriental (Blatta orientalis) y cucaracha americana (Periplaneta americana) y en estado de ninfas o adultos.

Número de Inscripción	14-30-06936 y 14-30-06936-HA
Composición	Clorfenapir 0,4%.
Formulación	Cebo en forma de gel.
Modo de empleo	Una gota de 0,1 g. de unos 4-5 mm. de ancho. La dosis varía según el tipo de cucaracha y el grado de infestación. Ver tabla adjunta. Aplicación localizada mediante dosificador de gel (pistola).
Plazo Seguridad	(No precisa)
Plaga Diana	Insectos rastreros (CUCARACHAS)
Presentación	30 g. x 4. Ref.: 0129605001

MODO DE EMPLEO:

MATERIALES:
Los cartuchos se han diseñado para ser utilizado con pistola dosificadora de cebo.

INSPECCIÓN:
MYTHIC Gel es más eficiente cuando se coloca en lugares donde las cucarachas están presentes, o cerca de ellos. En los lugares en los que buscan o preparan alimentos. Estos lugares son por lo general, oscuros, cálidos, húmedos, y tranquilos, por ejemplo en la parte posterior del refrigerador, en las instalaciones eléctricas. Hay que inspeccionar lo lugares descritos para localizar áreas infestadas.

ANTES DEL TRATAMIENTO:
Para obtener los mejores resultados, la zona tratada debe ser limpiada y debe estar libre de todas las fuentes de alimentos que no sean el gel.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO:
Las áreas tratadas deben ser re-inspeccionados 2 a 3 semanas después del tratamiento. En infestaciones graves, puede ser necesaria una segunda aplicación de MYTHIC GEL si se consumió el primer tratamiento y si las cucarachas permanecen.

TRATAMIENTO:
Debe colocarse en forma de pequeñas gotas en las áreas infestadas.

Las gotas de gel se deben aplicar en lugares oscuros, en grietas, hendiduras, detrás de los armarios y estantes, debajo de los aparatos domésticos, en cajas eléctricas, rampas de basura, conductos. No aplicar en los lugares donde se puede sumergir, en lugares donde es probable que se elimine por la limpieza de rutina. No rociar insecticida en ó alrededor del área tratada con gel, perdería su atractivo.

Las cucarachas mueren de 24 a 48 horas después del tratamiento.

DOSIS DE TRATAMIENTO:
En caso de infestación severa y / o zonas sucias y congestionadas o si existen otras fuentes de alimentos y no pueden ser completamente eliminados, utilizar una dosis. más alta.

DOSIS DE MYTHIC GEL
(Puntos de 0,1 g. por metro cuadrado de superficie a tratar)

TIPO DE CUCARACHA	INFESTACIÓN NORMAL	INFESTACIÓN SEVERA
Cucaracha alemana	1	2
Cucaracha negra	1	2
Cucaracha americana	2	3

Goliath Gel

BASF
The Chemical Company

- **Características**

Con 1 cartucho de 35 g. se obtienen más de 1.100 puntos estándar de 0,03 g. y se pueden eliminar más de un millón de cucarachas (Blatella germanica).

1 gota de 0,03 g. de Goliath Gel elimina 1000 cucarachas.

Efecto duradero, gracias a su formulación que permanece atractiva y activa durante más de 12 semanas.

Con un cartucho de 35 g. podemos tratar más de 20 viviendas o varios establecimientos de restauración.

Con Goliath Gel se utiliza hasta un 70% menos de cebo frente a otros cebos en gel.

Un cartucho de Goliath Gel es equivalente a 3 cartuchos de otros cebos en gel, por lo que su relación coste/eficacia es muy superior a la que se podría deducir de una simple comparación basada en el precio de compra del cartucho.

■ Número de Inscripción	09-30-01343 y 09-30-01343-HA (Certificado Prorroga Autorización).
■ Composición	Fipronil 0,05%.
■ Formulación	Cebo en forma de gel.
■ Modo de empleo	Una gota de 0,03 g. de unos 3-4 mm. de ancho. La dosis varía según el tipo de cucaracha y el grado de infestación. Ver tabla adjunta. Aplicación localizada mediante dosificador de gel (pistola).
■ Plazo Seguridad	(No precisa)
■ Plaga Diana	Insectos rastreros (CUCARACHAS)
■ Presentación	35 g. x 4. Ref.: 0129602001

DOSIS DE GOLIATH GEL

(Puntos de 0,3 g. por metro cuadrado de superficie a tratar)

TIPO DE CUCARACHA	INFESTACIÓN NORMAL	INFESTACIÓN SEVERA
Cucaracha alemana	1	2
Cucaracha negra	2	3
Cucaracha americana	2	3

TIPO DE UBICACIÓN	PUNTOS REQUERIDOS
Vivienda-cocina	10-25
Vivienda-baño	Hasta 12
Vivienda-otras habitaciones	Hasta 12
Cocina industrial (capacidad media para 40-50 comensales)	100-300
Bares y restaurantes (capacidad media 40-50 comensales)	60-100

ACCESORIOS	REFERENCIAS
Dosificador SP	073160101
Dosificador + Malentin SP	0731604001
Cartuchera SP	0731602001
Dosificador GB (Plástico)	0703801001
Dosificador gel TG regulable	0731604001
Kit agujas dosificación metálicas rectas 12 u.	0731606012
Kit agujas dosificación metálicas curvadas 5 u.	0731611005
Kit agujas dosificación plástico 12 u.	0731605012
Portacebo insecticida GMB	0700004100

Fourmidor

BASF
The Chemical Company

Características

Cebo de alta eficacia para el control completo de colonias de hormigas.

Formulación a base de fipronil, lista para usar, de eficacia demostrada, muy potente y de efecto constante y duradero.

Irresistible formulación en forma de melaza. Formulación estudiada que demuestra que los cebos en forma de gel más líquidos, ricos en carbohidratos son especialmente atractivos para las hormigas recolectoras.

Rápido y completo control de colonia de hormigas. Eficacia probada, del fipronil a bajas dosis. La concentración del 0,5% de fipronil, está estudiada para que las hormigas al ingerir el cebo tengan el tiempo necesario para compartir esta melaza de alta palatabilidad con toda la colonia antes de morir.

El insecticida comienza a tener efecto letal entre las 12 y 24 horas posteriores a la ingestión. Adultos, larvas y reinas mueren sistemáticamente después de haber ingerido el cebo, incluso en pequeñas cantidades, produciéndose la muerte de la colonia en un plazo de 10-14 días.

El principio activo actúa con mayor rapidez y eficacia que los ingredientes activos de otros insecticidas que se usan habitualmente para el control de hormigas.

Ha demostrado la máxima efectividad frente a hormigas negras de jardín (Lasius niger), hormiga amarilla (Lasius flavus) y otras especies de la subfamilia Formicinae.

Es un cebo gel líquido listo para aplicar de forma rápida y fácil de utilizar en interiores y exteriores.

Número de Inscripción	12-30-06299 y 12-30-06299-HA
Composición	Fipronil 0,05%.
Formulación	Cebo en forma de gel.
Modo de empleo	1 gota de 0,03 g. (3-4 mm.) cada 30 cm. Aplicación localizada mediante dosificador de gel (pistola). Un cartucho de 25 ml. es suficiente para tratar infestaciones de 250 m. lineales.
Plazo Seguridad	(No precisa)
Plaga Diana	Insectos rastreros. HORMIGAS
Presentación	25 g. x 4. Ref.: 0129607001





DISTRIBUCIONES BASF. CEBO EN GEL

Mythic SC

BASF
The Chemical Company

Características

Mythic® es una nueva clase de insecticida con un nuevo mecanismo de acción.
Su ingrediente activo Clorfenapir se activa después de la ingestión causando parálisis y muerte de los insectos al impedir que las células generen energía.
Es un nuevo insecticida, no piretroide, no repelente, indetectable para combatir un amplio espectro de insectos y es particularmente eficaz contra las chinches e incluso en situaciones de resistencia a otros insecticidas.
Particularmente útil para minimizar la propagación de chinches.
Nueva solución cuando hay sospecha de posibles resistencias a los tratamientos de pulverización convencional de piretroides.
Es ideal en los programas de tratamiento integrales, primero utilizando un piretroide con acción inmediata tipo FENDONA y luego utilizando MYTHIC, que proporciona alta residualidad, y así minimizar la propagación de la plaga (p.e. chinches).
La formulación garantiza una excelente adhesión a todas las superficies (mortero, cemento, madera…) y una acción residual de larga duración en la mayoría de superficies.
Numerosos estudios han demostrado que Mythic® es especialmente eficaz contra las chinches, hormigas y cucarachas.
Se presenta en forma de suspensión concentrada en base acuosa, libre de solventes, limpio, bajo olor, no corrosivo, fácil de dosificar y aplicar.
Se aplica con pulverizadores convencionales previa dilución en agua. Contiene 106 g/litro de clorfenapyr.

Número de Inscripción	11-30-06183 y 11-30-06183-HA
Composición	Clorfenapir 10%.
Formulación	Suspensión concentrada (SC).
Modo de empleo	80-160 ml. en 5 litros de agua para tratar 100 m² (Chinches y cucarachas) 40 ml en 5 litros de agua para tratar 100 m² (Hormigas) Aplicación localizada dirigida a superficies, zócalos y suelos mediante pulverización de gota gruesa del producto diluido en agua.
Plazo Seguridad	12 horas.
Plaga Diana	Insectos rastreros. CUCARACHAS HORMIGAS CHINCHES
Presentación	500 ml. x 4. Ref.: 0129603001

Fendona

BASF
The Chemical Company

Características

Insecticida de contacto e ingestión de acción inmediata con buena eficacia residual y un amplio espectro de acción. Las partículas cristalinas microscópicas de la Alfacipermetrina garantizan un alto grado de eficacia con dosis mínimas en todo tipo de superficies. Producto de alto rendimiento, se aplica a dosis muy bajas. Posee gran efecto de choque y un excelente efecto expulsivo que obliga a los insectos a salir de sus escondites, al tiempo que posee un prolongado efecto residual, incluso sobre superficies muy absorbentes. Insecticida en base acuosa, libre de solventes, limpio, inodoro, no corrosivo, fácil de dosificar y aplicar.



Rápida actuación y largo periodo transcurrido hasta la pérdida del efecto duradero

Número de Inscripción	13-30-00006 y 13-30-00006-HA
Composición	Alfacipermetrina 6%.
Formulación	Suspensión concentrada (SC).
Modo de empleo	5-10 ml. por litro de agua para 100 m². Aplicación localizada dirigida a superficies, zócalos y suelos mediante pulverización de gota gruesa del producto diluido en agua.
Plazo Seguridad	12 horas.
Plaga Diana	Insectos rastreros: CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS ARAÑAS CHINCHES
Presentación	500 ml. x 4. Ref.: 0129604001

Swirr 2 MG hormigas

NOVEDAD

- Número de Inscripción: 12-30-06291 y 12-30-006291-HA
- Composición: Acetamiprid 0,2%.
- Formulación: Sólido microgranulado.
- Modo de empleo: Espolvoreo. 20 g/m². Aplicar por espolvoreo dirigido a zócalos y suelos. Efectuar una barrera alrededor de las zonas a proteger. Pulverización. Diluir en agua, 100 g. por litro de agua para una superficie de 5 m². Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos. En caso necesario, volver a aplicar a las 2-3 semanas.
- Plazo Seguridad: No precisa para espolvoreo / 12 horas para aplicación por pulverización.
- Plaga Diana: Insectos rastreros: HORMIGAS
- Presentación: 500 g. x 6. Ref.: 0109602500

Hormifin Super Alfa

- Número de Inscripción: 11-30-01652 y 11-30-01652HA
- Composición: Alfacipermetrina 0,25%.
- Formulación: Cebo granulado (GR).
- Modo de empleo: Dosificar 1 punto por cada 2 m² aprox. Espolvoreo dirigido a zócalos y suelos.
- Plazo de seguridad: (No precisa)
- Plaga Diana: Insectos rastreros: HORMIGAS
- Presentación: 500 g. x 10. Ref.: 0110502500

Sofast

NOVEDAD

- Número de Inscripción: 13-30/50-06724 y 13-30/50-06724-HA
- Composición: Imidaclopird 0,5% Cis-tricos-9-eno 0,01%.
- Formulación: Cebo granulado (GR).
- Modo de empleo: 200 g. por cada 100 m² de superficie. Esparcir el cebo cada 10 m². Comprobar el estado del cebo cada 2-3 días, renovando cuando esté cubierto de polvo (sustitución del cebo cada 1-6 semanas, en función del nivel de infestación, suciedad...) Pulverización: diluir 100 g. en 100 ml. de agua por cada 50 m². Aplicar el producto diluido sobre zócalos y suelos.
- Plazo de seguridad: No precisa para espolvoreo / 12 horas para aplicación por pulverización.
- Plaga Diana: Insectos voladores: MOSCAS
- Presentación: 350 g. x 6. Ref.: 0142601350

AMP 5 GB

- Número de Inscripción: 09-30-/50-05361 y 09-30-/50-05361-HA (En renovación)
- Composición: Acetamiprid 0,5%. Z-9-tricoseno 0,06%.
- Formulación: Cebo granulado (GR).
- Modo de empleo: Dosificar 25 g. por cada 10 m² aprox. Esparcir el producto sobre zócalos y suelos.
- Plazo Seguridad: (No precisa)
- Plaga Diana: Insectos voladores: MOSCAS
- Presentación: 300 g. x 12. Ref.: 0110502400

CEBO EN BLOQUE

MKI Block

Número de Inscripción	10-30-05764 y 10-30-05764HA
Composición	Acetamiprid 1,5%.
Formulación	Cebo en bloque (BI).
Modo de empleo	Colocar 1 ó 2 bloques por cada 10-15 m^2, en portacebos correctamente etiquetados. Situar los portacebos en lugares frecuentados por insectos.
Plazo de seguridad	(No precisa)
Plaga Diana	Insectos rastreros: CUCARACHAS
Presentación	5 Kg. Ref.: 0100029005

POLVO

Somi

NOVEDAD

Número de Inscripción	13-30-06775 y 13-30-06775-HA (Certificado de Prorroga de Autorización).
Composición	Deltametrina 0,05%.
Formulación	Sólido en polvo.
Modo de empleo	Uso interior: 2-3 g/m^2. Aplicación directa por espolvoreo dirigida a zócalos y suelos. Uso exterior: aplicar de 30 a 60 g. por arqueta. En general, aplicar 35 g. por m^3 de conducto.
Plazo de seguridad	(No precisa)
Plaga Diana	Insectos rastreros: CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS CHINCHES
Presentación	500 g. x 6. Ref.: 0142602005

SUSPENSIONES CONCENTRADAS

Deflow

Número de Inscripción	09-30-03694 y 09-30-03694-HA (Certificado de Prórroga de Autorización).
Composición	Deltametrina 2,5%.
Formulación	Suspensión concentrada (SC).
Modo de empleo	Dosificar de 3,5 a 5 ml.(cc) por 1 litro de agua. Aplicación localizada mediante pulverización del producto diluido en agua, dirigida a zócalos y suelos.
Plazo de seguridad	12 horas.
Plaga Diana	Insectos rastreros y voladores: CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS ARAÑAS CHINCHES MOSCAS AVISPAS
Presentación	1L x 4. Ref.: 010001901 (Ambiental)/0100019HA1 (Ind. Alim.)

Dobol 30/120

NOVEDAD

- Número de Inscripción: 14-30-07234 y 14-30-07234-HA
- Composición: Acetamiprid 3% + Permetrina 12%.
- Formulación: Emulsión Concentrada (EC).
- Modo de empleo: Diluir 160 ml. en 5 L. de agua. Pulverización localizada del producto diluido en agua, dirigida a zócalos y suelos.
- Plazo Seguridad: 12 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros y voladores: CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS
- Presentación: 500 ml x 6 — Ref.: 0109601500 (Amb.) Ref.: 01096015HA (Ind.Alim.)

Permapin 12,5

- Número de Inscripción: 08-30-00810 y 08-30-00810-HA
- Composición: Permetrina 12,5%
- Formulación: Emulsión Concentrada (EC)
- Modo de empleo: Diluir 50 ml. en 5 L. de agua.
  Pulverización localizada del producto diluido en agua, dirigida a zócalos y suelos.
  Nebulización del producto diluido en agua o termonebulización del producto diluido en dietilenglicol (sólo uso ambiental)
  En termonebulización: 100 ml. en 10 L. de Visuater.
- Plazo de seguridad: 12 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros y voladores: CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS
- Presentación: 1L x 12 — Ref.: 0100004001 (Amb.) Ref.: 100004HA1 (Ind.Alim.)

Cyper-Cis

- Número de Inscripción: 11-30-00806 y 11-30-00806-HA
- Composición: Cypermetrina 12,5%
- Formulación: Emulsión Concentrada (EC)
- Modo de empleo: Dosis choque: 75 ml. en 10 L. de agua.
  Dosis mantenimiento: 50 ml. en 10 L. de agua.
  En termonebulización: 100 ml. en 10 L. de Visuater. Pulverización localizada del producto diluido en agua, dirigida a zócalos y suelos.
  Nebulización del producto diluido en agua o termonebulización del producto diluido en dietilenglicol (sólo uso ambiental).
- Plazo de seguridad: 12 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros y voladores: CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS
- Presentación: 1L x 12 — Ref.: 0100006001 (Amb.) Ref.: 0100006HA1 (Ind.Alim.)

FIJADOR EN GEL

MKI Cimex

- Número de Inscripción: 12-30-06236 y 12-30-06236-HA
- Composición: Acetamiprid 0,25%.
- Formulación: Fijador en gel.
- Modo de empleo: 20 a 35 g. por metro lineal. Aplicación localizada en grietas y rendijas en lugares de difícil acceso, desde el envase, con aplicador específico.
- Plazo de seguridad: (No precisa)
- Plaga Diana: Insectos rastreros: CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS CHINCHES
- Presentación: 5 Kg. x 4. Ref.: 0100002005
  1 Unid. Ref.: 0506601001 (Dosificador CHS-3AN)

MKI Fijador PLUS

- Número de Inscripción: 10-30-05747 y 10-30-05747-HA
- Composición: Acetamiprid 1%.
- Formulación: Fijador en gel.
- Modo de empleo: 20 a 35 g. por metro lineal. Aplicación manual con brocha o espátula dirigida a zócalos y suelos en lugares de difícil acceso.
- Plazo de seguridad: (No precisa)
- Plaga Diana: Insectos rastreros: CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS
- Presentación: 5 Kg. x 4. Ref.: 0100014005
  300 g. x 12. Ref.: 0100014300

LACAS

MKI Aqualak

- Número de Inscripción: 13-30-06639 y 13-30-06639-HA
- Composición: Acetamiprid 0,25%.
- Formulación: Laca líquida.
- Modo de empleo: 20 a 35 ml. por metro lineal. Aplicar por pulverización localizada y dirigida a zócalos y suelos con el producto puro.
- Plazo de seguridad: 12 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros: CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS CHINCHES
- Presentación: 5 Kg. x 4. Ref.: 0100007005

Adylac aerosol

- Número de Inscripción: 14-30-02450
- Composición: Tetrametrina 0,25%, Alfacipermetrina 3,51%, Cifenotrin 0,3%, Deltametrina 1%, Piriproxifen 0,011%.
- Formulación: Laca en aerosol.
- Modo de empleo: Formar una banda de 10 a 20 cm. de ancho. Aplicación localizada por pulverización, dirigida a zócalos y suelos.
- Plazo de seguridad: 24 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros: CUCARACHAS HORMIGAS ARAÑAS CHINCHES
- Presentación: 500 ml. x 6. Ref.: 0100003900

Pire Fog Plus FD

- Número de Inscripción: 15-30-05222 HA
- Composición: Tetrametrina 0,65%, d-Fenotrin 0,16%, Cifenotrin 0,51%, Piriproxifen 0,01%
- Formulación: Aerosol
- Modo de empleo: Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos.
- Plazo de seguridad: 12 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros: CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS ARAÑAS ÁCAROS
- Presentación: 250 ml. x 8. Ref.: 0110702HA8

Pire Fog FD

- Número de Inscripción: 09-30-05273 HA (En renovación)
- Composición: Tetrametrina 0,65%, d-Fenotrin 0,16%, Cifenotrin 0,51%.
- Formulación: Aerosol.
- Modo de empleo: Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos.
- Plazo de seguridad: 12 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros: CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS ARAÑAS ÁCAROS
- Presentación: 250 ml. x 8. Ref.: 0110701HA8

Pire Fog

- Número de Inscripción: 15-30-02875
- Composición: Tetrametrina 0,65%, d-Fenotrin 0,16%, Cifenotrin 0,51%.
- Formulación: Aerosol.
- Modo de empleo: 250 ml. para tratar un volumen de 250 m³. Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos.
- Plazo de seguridad: 12 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros y voladores: CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS ÁCAROS
- Presentación: 250 ml. x 8. Ref.: 0110701008

Pire Fog Plus DT

- Número de Inscripción: 15-30-05203
- Composición: Tetrametrina 0,65%, d-Fenotrin 0,16%, Cifenotrin 0,51%, Piriproxifen 0,01%.
- Formulación: Aerosol.
- Modo de empleo: 250 ml. para tratar un volumen de 250 m³. Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos.
- Plazo de seguridad: 12 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros y voladores: CUCARACHAS HORMIGAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS ÁCAROS
- Presentación: 250 ml. x 8. Ref.: 0110702008

TERMONEBULIZABLE LISTO USO

Perme Fog

- Número de Inscripción: 14-30-05038
- Composición: Permetrina 1,25%.
- Formulación: Líquido termonebulizable.
- Modo de empleo: Para insectos voladores: 1 L. por cada 5.000 m^3. Para insectos rastreros: 1 L. por cada 100 m^3. Termonebulización del producto puro.
- Plazo de seguridad: 12 horas.
- Plaga Diana: Insectos rastreros y voladores: CUCARACHAS HORMIGAS PULGAS MOSCAS MOSQUITOS POLILLAS
- Presentación: 5L x 4. Ref.: 010001005

VISUALIZADORES

Visuater

- Número de Inscripción: No procede
- Composición: Glicol/es.
- Formulación: Líquido emulsionable.
- Modo de empleo: Usar puro. Utilizar como diluyente en tratamientos por termonebulización.
- Plazo de seguridad: (No precisa)
- Presentación: 5L x 4. Ref.: 0100008005

TRAMPAS MONITORIZACIÓN

Portacebo insecticida GMB

- Características: Estación portacebo para la colocación de cebos insecticidas presentados en formato bloque, gel, granulado… Válido para insectos tales como cucarachas y hormigas.
- Dimensiones: 41x38x30 mm.
- Presentación: 200 u. Ref.: 0700004100

Estación portatrampa insectos grande

- Características: Estación portatrampa reutilizable para cucarachas e insectos rastreros, de gran tamaño, con una amplia superficie de captura. Se puede acoplar a la Estación Cebadero de Alta Seguridad de Ratón.
- Dimensiones: 205x120x24 mm.
- Presentación: 50 u. Ref.: 0700026050

Trampa adhesiva insectos grande

- Características: Trampa adhesiva para la captura y monitorización de insectos: cucarachas, hormigas, gorgojos, escarabajos, etc. Con atrayente alimenticio incorporado.
- Dimensiones: 176x90 mm.
- Presentación: 150 u. Ref.: 0426214150

Roach Trap Monitor "catchmaster"

CATCHMASTER®

Características	Trampa adhesiva para la captura y monitorización de cucarachas. Con atrayente alimenticio incorporado. Permite dividir la trampa en tres partes o unidades. La base incorpora una cinta adhesiva para facilitar su fijación bajo mostradores, mesas, vitrinas, etc.
Dimensiones	192x82x30 mm.
Presentación	72 u. Ref.: 0426204072

Caja Monitorización insectos mod. MD101 F

Características	Caja de plástico, para uso con trampas adhesivas monitorización de insectos. Posibilidad de usar individualmente o en combinación con el portacebo de ratón multifunción. Puede acoplarse a la parte de abajo del portacebo de ratón multifunción. Color negro.
Dimensiones	106x85x19 mm.
Presentación	Caja monitorización mod. 101 F. 60 u. Ref.: 0713307060



Trampa adhesiva insectos pequeña

Características	Trampa adhesiva para la captura y monitorización de cucarachas. Con atrayente alimenticio incorporado.
Dimensiones	80x60 mm.
Presentación	150 u. Ref.: 0409101200

Estación portatrampa insectos pequeña

Características	Estación portatrampa reutilizable para cucarachas e insectos rastreros, de pequeño tamaño. Se puede acoplar a la Estación Cebadero de Alta Seguridad de Ratón.
Dimensiones	150x100x24 mm.
Presentación	100 u. Ref.: 0700027100

Trampa plástico multicaptura roedores/insectos

- **Características** — Trampa de captura múltiple de ratones, fabricada en plástico.
  Permite capturar varios ratones, sin necesidad de cebo, así como insectos rastreros (cucarachas, hormigas, arañas, escarabajos…).
  Con tapa traslúcida para inspeccionar las capturas.
  No incluye trampa adhesiva.
- **Dimensiones** — 270x170x50 mm.
- **Presentación** — Trampa plástico multicaptura.
  12 u. Ref.: 0700602012

Recambio adhesivo TC roedores/insectos

Recambio para las trampas multicaptura.
Trampa de cartón, con adhesivo, para captura de ratones. Con atrayentes alimenticios.
Permite su utilización de forma plana o convertida en caja tipo cebadero.

- **Dimensiones** — 256x103 mm
- **Presentación** — 72 unidades. Ref: 0426213072

Portacebo Multifunción Master Box Big

Múltiples funciones en un mismo portacebo: portacebo roedores, caja para trampas de captura adhesiva y mecánica, y captura y monitorización de insectos.
Permite introducir la trampa adhesiva plástico captura ratas "Rat Glue Traps".
Permite introducir 2 trampas mecánicas de presión.
Permite introducir una trampa monitorización cucarachas e insectos rastreros.
Cada portacebo contiene: 2 llaves, 4 varillas plástico sujeción de cebo, 2 fijaciones a pared.

Producto	DIM. (mm)	REF.
PORTACEBO MASTER BOX BIG	340x210x130	0709001009
RAT GLUE TRAPS	261x134	0426203048
RECAMBIO ADHESIVO TC ROEDORES/INSECTOS	256X103	0426213072



Trampa Lepidópteros (Plodia spp...)

Características	Eficaz para Ephestia Cautella, Ephestia Elutella, Ephestia Kuehniella, Plodia Interpunctella, Cadra Figuliella…
Contenido del kit	6 trampas de cartón con cuadrícula impregnado con adhesivo, 3 capsulas de feromonas (sexuales), 3 alambres para colgar, instrucciones de uso. Duración de la feromona: 4-6 semanas.
Presentación	1 Kit. Ref.: 0429801001 25 Feromonas. Ref.: 0429814001

Trampa Polilla de la ropa (thineline)

Características	Eficaz para Tineola biselliella (polilla de la ropa).
Dimensiones	190x90x14 mm.
Contenido del kit	10 trampas de cartón con cuadrícula impregnado con adhesivo, 5 capsulas de feromonas (sexuales), 5 soportes de cartón, instrucciones de uso. Duración de la feromona: 4-6 semanas.
Presentación	1 Kit. Ref.: 0429806001

Trampa Coleópteros Multiespecies
(oryzaephilus spp...)

Características	Trampa diseñada para capturar una amplia gama de coleopteros que atacan a los productos almacenados. Orizaephylus spp, (carcoma de los granos), Stegobium spp (subespecies del escarabajo del pan), Sitophilus spp (gorgojo de los cereales), Rhizopertha dominica (barrenadores del grano), Tribolim spp, Troogoderma spp, y Lasioderma serricorne.
Contenido del kit	5 trampas (forma de cono truncado), 5 discos absorbentes, 1 bote de cebo atrayente (kairomona), instrucciones de uso.
Presentación	1 Kit. Ref.: 0429804001

Trampa Coleópteros específicas

Características	Trampa específica para las siguientes especies: Tribolium, Trogoderma, y Lasioderma serricorne.
Contenido del kit	5 trampas (forma de cono truncado), 5 capsulas de feromonas, 5 discos absorbentes, 1 bote de cebo atrayente (kairomona), instrucciones de uso.
Presentación	1 Kit Trampa coleopteros Tribolium spp. Ref.: 0429802001 1 Kit Trampa coleopteros Trogoderma spp. Ref.: 0429803001 1 Kit Trampa coleopteros Lasioderma serricorne. Ref.: 0429805001 25 Feromonas Tribolium spp. CFB. Ref.: 0429812001 25 Feromonas Trogoderma spp. KB. Ref.: 0429813001 25 Feromonas Lasioderma serricorne CB. Ref.: 0429814001

Trampa de voladores FLY Catcher

Características	Trampa de plástico reutilizable, destinada al control de moscas, avispas y otros insectos voladores. Es hermética, permite incluir atrayentes líquidos o sintéticos.
Medidas	140 x 100 mm.
Capacidad	1.000 ml.
Presentación	24 u. Ref.: 0700606024

Atrayente de avispas/moscas

Características	Producto natural que produce un olor que atrae a los insectos. Verter directamente en el fondo de la trampa 3-4 cucharadas de producto. Añadir ½ litro de agua aprox. Remover y cerrar la tapa.
Medidas	140 x 100 mm.
Capacidad	375 g.
Presentación	12 u. Ref.: 0416302001

Banda Atrapainsectos

CATCHMASTER®

Características	Trampa adhesiva de alta eficacia de captura, diseñada para controlar infestaciones graves de insectos voladores. Para uso en establos, granjas, invernaderos, depósitos de basuras… Compuesta por una tela impregnada de pegamento, con superficie de captura de doble cara. Incorpora tres tipos de atrayentes: sexual, alimenticio y de color. Instalación vertical u horizontal. Cobertura recomendada: 1 trampa para 50 m².
Contenido	Trampa con pegamento, tubo exterior, 2 clips, 1 cuerda, 2 ganchos
Capacidad	7 m x 0,28 m.
Presentación	12 u. Ref.: 0426208001

Trampa picudo rojo de la palmera

Características	Trampa de suelo, destinada para la captura del picudo rojo y otros coleópteros. De alta eficacia. Sistema ecológico.
Modo de empleo	Usar a modo de barrera, rodeando los palmerales para evitar la entrada, o dentro del palmeral como trampeo masivo para reducir el ataque de la plaga.
Contenido	Una campana cuyo exterior es rugoso, con inclinación, e interior con forma de embudo invertido. Soporte porta feromonas, que además protege la trampa. Recipiente interior para rellenar con agua, y recoger las larvas. Feromona de agregación, con una duración aprox. de 3-4 meses.
Presentación	Trampa. 12 u. Ref.: 1500010001 Feromona. 2 u. Ref.: 1500011001

Trampa procesionaria del pino

Diseñada para la captura y monitoreo de procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), en su fase voladora (adulta), y puede utilizarse para otros insectos. Dispone de 2 entradas laterales, un depósito a modo de bolsa, y un cesto para colocar la feromona o atrayente. Es desmontable totalmente y permite su manejo de forma sencilla.

Presentación	Trampa. x10 u. Ref.: 1500012001 Atrayente. x2 u. Ref.: 1500013001

Fundas de colchón anti-chinches y antiácaros

NOVEDAD

- Características

Barrera completa anti-chinches, antiácaros y sus alérgenos.
Sistema hermético de protección total del colchón.
Esta funda protege el colchón en dos direcciones:
Del interior al exterior, bloque la infección y la elimina (para colchones que se están usando).
Del exterior al interior, impide las colonizaciones (para colchones nuevos o sin problemas).
Con la funda se evita cambiar el colchón colonizado de ácaros, chinches y otros insectos.
Previene eficazmente contra las infestaciones de ácaros y chinches.
Funda extensible y adaptable de rizo absorbente.
Transpirable e impermeable. Por su revestimiento de membrana de PU. Membrana Técnica.
Avanzada de Poliuretano microporoso.
Permite transpirar al colchón y la almohada y evita el enmohecimiento.
Al mismo tiempo es impermeable y protege frente a incontinencias y manchas al colchón.
Cremallera compacta en "L", con doble pespunte de seguridad antifugas.
Cierre de seguridad y costura de bloqueo que garantiza la estanqueidad de la cremallera.
Sistema hermético de protección total del colchón.
Altamente resistente a continuos lavados.
Protección certificada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ensayos realizados demuestran que las fundas presentan una barrera total antiácaros, anti-chinches y otros insectos.

- Presentación

Talla 90x200x25. Ref.: 0700501001
Talla 105x200x25. Ref.: 0700502001
Talla 135x200x25. Ref.: 0700503001
Talla 150x200x25. Ref.: 0700504001

Trampa Monitoreo chinches BDS-SLDR96

NOVEDAD

Características	Trampa de chinches diseñada para la captura de chinches, con entradas por los cuatro lados que son atrapadas por el adhesivo. Fácil inspección gracias a su ventana transparente. El diseño en plástico resistente permite el uso bajo los colchones.
Medidas	70 x51x16 mm.
Presentación	96 u. Ref.: 0426212096

Trampa Monitoreo chinches BDS 2.0

NOVEDAD

Características	Trampa de chinches diseñada para crear un refugio para las mismas, y así poder detectar su presencia, antes de que proliferen e infesten otra nueva ubicación. Incluye banda adhesiva para fijación. También se pueden utilizar después del tratamiento para evaluar la eficacia del mismo, detectar la disminución de la plaga.
Medidas	46 x 159 mm.
Presentación	72 u. Ref.: 0426211072